

REGIONE VENETO
 AZIENDA ULSS 18
 ROVIGO
 U.O.C. di Pneumologia
 Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
 Direttore Dott. G. Milani

TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA

Sig.data esame

Si prega di telefonare allo 0425/393391 per annullare o modificare l'appuntamento

Poiché i farmaci usati nel trattamento dell'asma riducono la reattività bronchiale è necessario sospenderli precedentemente, secondo questa tabella:

FARMACO	TEMPO DI SOSPENSIONE
Broncodilatatori a breve durata (SALBUTAMOLO/TERBUTALINA) VENTOLIN, BRONCOVALEAS/BRICANYL)	8 ore
Broncodilatatori a lunga durata (SALMETEROLO, FORMOTEROLO, INDACATEROLO, VILANTEROLO): SALMETEDUR/ SEREVENT, FORADIL/EOLUS, HIROBRIZ/ONBREZ	48 ore
BRONCODILATATORE + steroide (FOSTER/INUVER, SERETIDE/ALIFLUS, SYMBICORT, ABRIF, RELVAR/REVINTY)	1 settimana
Anticolinergici (TIOTROPIO) SPIRIVA	72 ORE
Anticoleucotrienici (MONTEGEN, SINGULAIR, LUKASM)	24 ORE
Antiistaminici (AERIUS, FORMISTIN, FRISTAMIN, XYZAL, AYRINAL, ZIRTEC, PAFINUR, ROBILAS, CLARITYN, CLEVER)	4 -7 giorni
Cortisonici orali (DELTACORTENE, MEDROL, BENTELAN, DEFLAN, URBASON)	4 settimane
Cortisonici topici (FLUSPIRAL, FLIXOTIDE, CLENILEEX, CLENIL, ALVESCO)	1 settimana
Caffè, te, cioccolato, "cola drink"	Giorno del test
ASTENSIONE DAL FUMO DI SIGARETTA	

Il paziente non deve essere affetto da infezioni delle vie aeree da almeno 6 settimane