Redatto	Approvato
Alessandro Camerotto, Flora Formenton, Sabina Magagna, Giorgia Romanato, Roberta Marinelli, Valentina Muraro, Alice Stoppa, Assunta Farella	Alessandro Camerotto

Aggiornato 10.11.2026

Gentile utente, operatore,
questo catalogo (**CPL)** descrive l'offerta delle prestazioni della UOC Medicina di Laboratorio e le prestazioni più comuni per utenti esterni di Anatomia Patologica e Medicina Trasfusionale, accettabili presso i Centri Prelievi e le UO Ospedaliere.
In esso troverà:
-gli esami in ordine alfabetico o, in alternativa, selezionandoli del menu cliccando su **Trova**. Si aprirà una finestra dove inserire il nome del test o il codice del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) versione 2.5 del 30.10.26.
Premendo **Invio** il cursore si posizionerà su tutte le voci con il nome indicato.
- Modulo di richiesta per allergeni (in calce al CPL).
- Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL).
- Dichiarazione sostitutiva consegna campioni biologici da parte terza (in calce al CPL).

Il CPL è suddiviso in colonne:
nella colonna **Denominazione del test/Prestazione** è specificato il nome del test e l'eventuale sigla corrispondente.
Gli esami evidenziati in **rosso** sono richiedibili anche come urgenti da UO Ospedaliere.
I test evidenziati in **viola** sono richiedibili solo come urgenti da UO Ospedaliere e Ospedali di Comunità.

Nella colonna **Codice regionale (CVP) e codice CUP/WEB** è indicato il codice LEA attribuito al test dalla Regione Veneto nel CVP e, in carattere rosso, il codice utilizzabile in fase di accettazione dall'operatore del Centro Prelievi e UO ospedaliera. I codici regionali di questo catalogo sono quelli in uso nella ULSS 5.

Nella colonna **Metodo/tecnologia/strumento** è indicato il metodo/tecnologia con cui vengono eseguiti i test.

Nelle colonna **Matrice/provetta/note** è indicata la matrice (siero, plasma, urine, etc.) su cui viene eseguito il test, il colore del tappo della provetta o il contenitore, l'eventuale anticoagulante e particolari modalità di raccolta e conservazione del campione.

Nella colonna **Tempo di refertazione (TAT) e service** è indicato il tempo massimo di attesa del referto utenti esterni espresso come primo giorno lavorativo utile dal venerdì al sabato, escluso il giorno del prelievo. Di norma, comunque, l'80 % degli esami è disponibile entro le ore 16 del giorno del prelievo. I primi esami interni di routine sono visualizzabili nei terminali dei reparti dalle ore 10.00.
Gli esami richiedibili come urgenti dalle UO sono visualizzabili nei terminali entro 1 ora dall'arrivo del campione in Laboratorio.
Per **service** si intende test che, per scarsa numerosità o impossibilità tecnica di esecuzione, è inviato a strutture pubbliche venete. Questi esami, accettati informaticamente, sono completamente gestiti dal Laboratorio.

Nella colonna **Indicazioni per gli operatori dei Centri prelievo** sono indicate le peculiarità tecniche per gli operatori da adottare nella fase prelievo.

Nella colonna **Indicazioni pre-analitiche per il Laboratorio** sono descritte le indicazioni puntuali per gli operatori del laboratorio.

Note per i prescrittori

1. Gli esami rari/ultraspecialistici, per pazienti interni (UO, DH) non presenti nel CPL, sono richiesti direttamente dall'UO a laboratori pubblici extra azienda, senza accettazione informatica, utilizzando il modulo MOD/MLAB/15 richiedibile alla segreteria del Laboratorio di Rovigo.
2. Per informazioni relative all'unità di misura e intervalli di riferimento si rimanda al referto.
3. Per informazioni relative alla tariffa si rimanda al CVP.
4. Per informazioni su rilevanza clinica/scopo dell'esame si rimanda a www.labtestsonline.it
5. Le ricette/Dema hanno validità 180 giorni.
6. I prelievi dei bambini con età <6 anni sono eseguiti esclusivamente nei Centri Prelievi Ospedalieri.
7. La priorità U nell'impegnativa dell'utente esterno ha l'esclusiva funzione di poter accedere ai centri prelievi senza prenotazione.

Note per gli operatori addetti ai prelievi e alla fase preanalitica

1. Per "sierare" si intende la centrifugazione e separazione della parte liquida ponendolo in altra provetta (aliquota). Per "immediatamente" si intende, dove non diversamente indicato, entro 15 minuti dalla fine del prelievo.
2. Per "aliquotare" si intende la separazione del siero/plasma dalla parte corpuscolata ponendolo in altra provetta (aliquota).
3. I test con matrice siero/plasma in cui non è presente alcuna indicazione vanno centrifugati.
4. Nei campioni urinari l'amministrativo del Laboratorio verifica che la quantità in mL di urina 24 ore sia presente in IVLIS.
5. Il tempo di conservazione va inteso come tempo massimo.

Denominazione del Test/Prestazione	Codice Regionale (CVP) e Codice Cup WEB	Metodo/ tecnologia/ strumento	Matrice/ provetta/note	Tempo refertazione (TAT) e service	Indicazioni per gli operatori dei Centri prelievo	Indicazioni pre-analitiche per il Laboratorio: vedi nota 10
Prelievo di sangue arterioso	**91.48.5_1**					
Prelievo di sangue venoso	**91.49.2_1** **pv**		Sono eseguiti i prelievi anche per prestazioni di Microbiologia e Medicina Trasfusionale			
Prelievo microbiologico: tamponi faringeo, linguale, cutanei, da ferita/ulcera, uretrali maschili, balano-prepuziali, auricolari, nasali, oculari, anali e perianali, periungueale. Esame colturale ungueale per ricerca miceti	**91.49.3_1** **pm**		Fase analitica e refertazione eseguite da UOSD Microbiologia			
Acidi biliari (Sali biliari)	**90.01.5_0** **7341**		Siero, blu-giallo	10 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 7 giorni a 2-8 °C.
Acido citrico (Citrato)	**90.02.2_3** **7208**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, acquisibile presso Centri Prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Evitare da due giorni precedenti e per tutto il tempo della raccolta assunzione di agrumi e Vit. C. Mantenere refrigerato durante la raccolta	21 Mestre		Conservare a 2-8 °C
Acido Delta Aminolevulinico (ALA) E' refertato anche porfobilinogeno	**90.02.3_0** **90.37.2_0** **90.16.3_3** **7396**		Urina 24 ore (contenitore senza conservanti) o urina estemporanea. Contenitori acquisibili presso farmacie. Tenere al buio e refrigerato proteggendo con carta stagnola	20 Padova Tossicologia Industriale		Conservare a 2-8 °C (proteggere con carta stagnola).

Acido 5 idrossi 3 indolacetico. (5-HIAA)	**90.02.1_0** **7200**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. ***Dieta:*** A partire dai 2 giorni precedenti la raccolta delle urine e durante la stessa, evitare di mangiare banane, prugne, caffè, the, cioccolato, kiwi, ananas, avocado, noci, nicotina, verdure	31 Mestre		Conservare a 2-8 °C.
Acido lattico (lattato). Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo **Acido lattico su liquor: vedi Liquor chimico fisico** **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.02.5_2** **275**	Colorimetrico/lattato piruvato. Cobas 702 Roche.	Plasma, grigio-bianco, Fluoruro di sodio + Potassio ossalato.	1	Centrifugare e sierare. Conservare l'aliquota a 2-8 °C	Centrifugare e sierare. Conservare l'aliquota a 2-8 °C
Acido micofenolico Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.17.B_29** **new7405**		Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL	9 Padova	Centrifugare e sierare entro 2 ore dal prelievo. Conservare aliquota a 2-8 C°	Centrifugare e sierare entro 2 ore dal prelievo. Conservare aliquota a 2-8 C°
Acido omovanillico	**90.38.G_2** **7212**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci	32 Mestre		Conservare a 2-8 °C.
Acido vanilmandelico (VMA)	**90.03.6_3** **new448**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16%, da versare nel contenitore prima della raccolta ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas,vaniglia, noci	32 Mestre		Conservare a 2-8 °C.
Acido Valproico (Valproato) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.17.C_2** **new1231**	Immunoenzimatico G6PDH Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Plasma, verde scuro, litio eparina urgenze	1		
Adrenalina, Noradrenalina (Catecolamine)	**90.03.6_6** **90.03.6_7** **new7510**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana,	32 Mestre		Conservare a 2-8 °C.

			cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci			
Alanina aminotransferasi (ALT, GPT)	**90.04.5_0 295**	IFCC con piridossal fosfato / Cobas 702 Roche.	Plasma, verde-giallo, litio eparina routine. Verde scuro, litio eparina, urgenze	1		
Alanina aminotransferasi (ALT, GPT) POCT	**90.04.5_0 295p**	IFCC modificato senza PP. Piccolo/De Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina			
Albumina	**90.05.1_2 525**	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche.	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Albuminuria (Microalbuminuria)	**90.33.4_3 new604**	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche.	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	1		
Microalbuminuria estemporanea Early morning per calcolo ACR ACR: albumin, creatinine ratio	**90.33.4_4 new663**	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche	Urina estemporanea. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie	1		
Aldosterone Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.05.3_3 basale/ ortostatismo 759** **90.05.3_2 clinostatismo 761**	Immunochemiluminescenza/Maglumi Medical Systems	Plasma, viola-nero, K2EDTA 6 mL.	15	**Abbinata clino/ ortostatismo**: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare quindi il prelievo in ortostatismo (da seduto). Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5 Centrifugare, sierare, conservare l'aliquota a 2-+8 °C	Centrifugare, sierare subito e conservare l'aliquota a -20°C.
Aldosterone urinario	**90.05.3_4 7500**		Urina 24 ore, contenitore senza conservanti, acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	15 Padova		Conservare a -20 °C.
Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica, Amilasi pancreatica)	**90.06.5_0 311**	Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina routine. Verde-nero, litio eparina urgenze	1		
Alfa amilasi totale (Amilasi Alfa)	**90.06.4_2 307**	Substrato EPS-G7/Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Alfa amilasi urina estemporanea/creatinina	**90.06.4_4 461**	Vedi alfa amilasi	Urina estemporanea. Vasetto sterile con dispositivo per	1		

		totale	successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie			
Alfa amilasi totale POCT	**90.06.4_2** **307p**	Assorbanza substrato CNPG3 Piccolo/De Mori	Plasma, verde- nero litio eparina.			
Alfa 1 antitripsina	**90.05.4_0** **517**		Siero, giallo-giallo	12 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 8 ore a 2-+8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C
Alfa 1 fetoproteina (AFP)	**90.05.5_2** **717**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo	1		
Alfa1 microglobulina	**90.06.2_3** **622**		Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenuta in luogo fresco durante la raccolta	15 Padova		Conservare 6 giorni a 2-8 °C. Evitare il congelamento
Alfa 2 macroglobulina	**90.06.3_2** **nn7323**		Siero, blu-giallo	8 Padova		Sierare e conservare l'aliquota 6 giorni a 2- 8 °C, per tempi più lunghi a -20°C.
Amfetamina/Metamfetamina/MDMA/ Ecstasy dosaggio qualitativo Non utilizzabile per fini medico legali.	**90.40.9_3** **new1251**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas Roche, Adria.	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione, acquisibile presso farmacie.	3		
Amiodarone	**90.17.B_9** **new7377**		Siero, arancio-nero	21 Padova		Sierare e conservare l'aliquota a 2- 8 °C
Ammonio Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.07.5_0** **273**	Enzimatica spettrofotom etrica Cobas Roche	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL.	1	Mantenere il campione refrigerato, centrifugare e sierare a 2-8°C. Conservare l'aliquota 2 ore a 2-8°C.	Mantenere il campione refrigerato. Centrifugare a 2-8°C. Sierare e conservare l'aliquota 2 ore a 2-8°C.
Anticorpi anti antigeni epatici IgG (ricerca anticorpi diretti contro: AMA-M2, M2-3E, Sp100, gp210, PML, LKM-1, LC-1, SLA/LP e Ro52)	90.52.5_28 **554**	Immunoblot/ Euroimmun	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM. Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgM	**90.49.6_4** **90.49.6_5** **7402** **90.49.6_4** **7402c** **90.49.6_5** **7402d**	CLIA Chemilumin escenza/BI OFLASH,W erfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti cardiolipina IgG-IgM (ACA) Anticorpi anti cardiolipina IgG Anticorpi anti cardiolipina IgM	**90.47.5_2** **90.47.5_3** **575** **90.47.5_2** **575A** **90.47.5_3** **575B**	CLIA Chemilumin escenza/BI OFLASH,W erfen	Siero, rosso-giallo	20		

Anticorpi anti cute: IgG anti desmosomi e anti membrana basale. Test qualitativo	**90.52.5_4** **7523**		Siero, giallo-giallo	26 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2- 8 °C
Anticorpi anti cellule parietali gastriche (APCA, PCA).	**90.48.1_0** **561**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA): Anticorpi anti mieloperossidasi (MPO)	**90.51.6_0** **579B** **580** **(MPO+PR3s)**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA): Anticorpi anti proteinasi 3 (PR3s)	**90.53.8_0** **579C** **580** **(MPO+PR3s)**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA, test screening) E' eseguito il test di conferma (90.48.3_3) solo in caso di positività del test di screening.	**90.48.3_2** **new554**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA I.F.I. Test di conferma)	**90.48.3_3** **new554**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti endomisio IgA (EMA)	**90.47.E_0** **569**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari - ENA screening (CTD screening)	**90.47.3_0** **581**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero,rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti-JO1	**90.47.7_0** **582**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari : anti-RNP	**90.47.8_0** **582**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti Scl-70	**90.47.9_0** **582**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti-Sm	**90.47.A_0** **582**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti -SS-A Ro 60	**90.47.B_3** **new581c60**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari anti -SS-A Ro 52	**90.47.B_4** **new581c52**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		

Anticorpi anti antigeni intracellulari anti-SS-B	**90.47.C_0 582**	CLIA Chemiluminescenza/BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti fattore intrinseco (IFA)	**90.52.5_9 7399**		Siero, rosso-giallo	15 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 48 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20 °C.
Anticorpi anti fosfolipidi: accettare anticorpi anticardiolipina IgG/IgM e anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.						
Anticorpi anti glutammico decarbossilasi (GAD)	**90.49.7_0 7363**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 5 giorni a 2-8°C, 3 mesi a -20°C.
Anticorpi anti insula pancreatica, anti beta- cellula, (ICA-IgG)	**90.50.5_0 7359**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 5 giorni a 2-8°C, 3 mesi a -20°C.
Anticorpi anti glicoproteina mielina associata (MAG)	**90.51.3_0 7371**		Siero, blu-giallo	35 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C.
Anticorpi anti insulina	**90.51.1_0 7378**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Sierare e conservare l'aliquota 5 giorni a 2-8°C, 3 mesi a -20°C.
Anticorpi anti membrana basale glomerulare	**90.48.9_0 an71pd**		Siero, rosso-giallo	30 Padova		
Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKM-1)	**90.51.5_0 563**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti miosite (ricerca anticorpi diretti contro: Mi-2alfa, Mi-2beta, TIF1gamma, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 e cN-1°)	**90.52.5_26 556**	Immunoblot / Euroimmun	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti mitocondri (AMA)	**90.52.1_0 557**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)	**90.52.2_0 559**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti antigeni intracellulari (ANA)	**90.52.4_0 551**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
ANA Reflex (Anticorpi anti antigeni intracellulari): comprende ANA in IFI (immunofluorescenza indiretta) e CTD screening (Connective Tissue Disease screening, CLIA). Regole per approfondimenti: 1. ANA e CTD screen negativi: nessun approfondimento 2. ANA ≥ 1:160 e CTD screen negativo: approfondimenti sulla base del quadro fluoroscopico 3. ANA negativo e CTD screen	**90.524_0 new551**	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		

positivo: ricerca dei singoli antigeni intracellulari (ENA) 4. ANA ≥ 1:160 e CTD screening positivo: ricerca dei singoli antigeni intracellulari (ENA) più eventuali approfondimenti in immunoblot						
Anticorpi anti peptidi citrullinati (Anticorpi anti citrulina)	**90.47.D_0** **587**	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti peptidi deamidati della gliadina IgG	**90.49.5_0** **new597b**	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo.	20		
Anticorpi anti recettore Acetilcolina (ARAB, anti AchR)	**90.53.9_0** **7357**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 1 giorno a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C.
Anticorpi anti recettore fosfolipasi A2	**90.52.5_2** **an72pd**		Siero, rosso-giallo	30 Padova		
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgG	**90.53.A_2** **590**		Siero, giallo-giallo	16 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8 °C
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgA	**90.53.A_3** **590**		Siero, giallo-giallo	16 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8 °C
Anticorpi anti surrene	**90.54.3_2** **new7381**		Siero, giallo-giallo	18 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8 °C
Anticorpi anti tireoglobulina (AbTG)	**90.54.4_0** **565**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	Siero, rosso-giallo	6		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 4 giorni a 2-8 °C , 2 mesi a -20°C, congelare una sola volta
Anticorpi anti tireoperossidasi (TPO) (anti microsomi tiroide)	**90.51.4_0** **new567**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria.	Siero, rosso-giallo	6		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 3 giorni a 2-8 °C, 1 mese a -20 °C. Congelare solo 1 volta.
Anticorpi anti tirosin chinasi (IA-2) anti tirosina fosfatasi.	**90.52.5_12** **7379**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 5 giorni a 2-8°C, 3 mesi a -20°C.
Anticorpi anti transglutaminasi IgA. Sono accettate in automatico anche IgA totali.	**90.53.D_2** **585**	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti transglutaminasi IgG	**90.53.D_3** **585a**	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti transglutaminasi adulto monitoraggio:	**90.53.D_4** **new585**	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen	Siero, rosso-giallo	20		
Anticorpi anti trasportatore dello zinco 8 (ZnT8)	**90.52.5_14** **7380**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 5 giorni a 2-8°C, 3 mesi a -20°C.
Antidepressivi triciclici (classe, dosaggio quantitativo tra cui	**90.17.C_45** **new1227**	Immunodosaggio.	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Plasma verde-nero litio eparina	1		

imipramina e amitriptilina) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**		Rilevazione enzimatica G6PDH/Werfen/ Cobas 702 Roche.	urgenze			
Antigene carboidratico CA 15.3	**90.55.2_0 753**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Antigene carboidratico CA 19.9 (GICA)	**90.55.3_2 new749**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Antigene carboidratico CA125	**90.55.1_0 751**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Antigene carboidratico CA 50	**90.55.3_3 new7333**		Siero, blu-giallo	17 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 30 giorni a 2-8°C, 3 mesi a-20°C.
Antigene carboidratico CA 72.4	**90.55.3_4 new7335**		Siero, rosso-giallo	23 Mestre		Centrifugare, sierare o conservare l'aliquota a 2-8°C .
Antigene polipeptidico tissutale (TPA)	**90.55.3_5 new7009**		Siero, blu-giallo	18 Padova		Centrifugare, sierare e conservare 2 l'aliquota 4 ore a 2-8 °C, per periodi più lunghi a -20°C
Anti Mulleriano Ormone (AMH) Solo per esterni	**90.17.G_0 new7014**		Siero, blu-giallo	15 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 6 giorni a 2-8 °C. Per periodi più lunghi a -20°C
Antitrombina funzionale (AT3, Antitrombina III) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica in urgenza solo a Rovigo e Adria**	**90.57.5_0 1107**	Cromogenic o/ STAR R Max 3 STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Apixaban Richiedibile in routine solo per pazienti con prescrizione effettuata presso ambulatori ospedalieri. **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo.**	**90.63.1_3 new1135**	Cromogenic o anti X attivato / STAR R Max 3 STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1		
Apolipoproteina- A1 (Apo A)	**90.08.4_0 263a**		Plasma, verde-giallo, litio eparina	3 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C.
Apolipoproteina B (Apo B)	**90.08.5_0 265b**		Plasma, verde-giallo, litio eparina	3 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C.
Aptoglobina (HPT) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.09.1_0 523**	Turbidimetri co Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina routine. Verde-nero, litio eparina urgenze	1		
Aspartato aminotransferasi (AST, GOT)	**90.09.2_0 293**	IFCC con piridossal fosfato	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		

		Cobas 702 Roche				
Bande oligoclonali Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS.	**90.69.4_13** **new548**		Liquor, provetta con tappo rosso a vite. Effettuare contestuale prelievo venoso: Siero, arancio-nero	25 Padova		Liquor: conservare (senza centrifugare) a -20 c°.Siero: sierare e conservare a -20 C°
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) qualitativo per diagnosi Prelievo eseguito dal lunedì a giovedì solo presso UO e Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo Necessario Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL) **Attenzione:** test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	**G8.01_16** **new599a** Nota per gli amministrativi: il campione deve essere accompagnato: ***per interni:*** dal MOD/MLAB/15 Esami extra aziendali; ***per esterni:*** da impegnativa con il quesito diagnostico e da MOD/MLAB/15 compilato dall'amministrativo Lab . Copia dei documenti deve essere inviata allo IOV e conservata in Segreteria Lab. per la tracciabilità (inviante) dei referti cartacei.		Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA 6 mL, 3 provette.	40 IOV	Conservare refrigerato	Conservare 24 ore campione tal quale a 2-8 C°
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) quantitativo per monitoraggio terapia Prelievo eseguito dal lunedì a giovedì solo da UO e Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo Necessario Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL) **Attenzione:** test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	**G8.01_17** **new621a**		Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA 6 mL, 3 provette. Conservare campione refrigerato	40 IOV		Conservare campione tal quale 24 ore a 2-8° C°.
Bence Jones (proteinuria di...)	**90.69.2_3** **610**	Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia	Urina II° minzione o estemporanea. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione sottovuoto. Acquisibile presso farmacie	8		
Benzodiazepine (Classe, dosaggio qualitativo) **Richiedibile in urgenza da tutte le**	**90.17.C_27** **new1201**	Immunodosaggio enzimatico. Subfornitore	Plasma, verde-giallo, litio eparina.	2		

UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo		Roche: Thermo Scientific Cobas 702 Roche				
Benzodiazepine, classe, dosaggio qualitativo. Non utilizzabile per fini medico legali	**90.17.C_28** **new1203**	Immunodosaggio enzimatico. Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas Roche, Adria	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo.	3		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Beta 2 microglobulina	**90.10.1_2** **7011**	Immunoturbidimetria/ Cobas 501 Roche, Adria	Siero, rosso-giallo	8		Centrifugare, sierare, e conservare l'aliquota 3 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 C°.
Beta 2 microglobulina urinaria	**90.10.1_3** **7509**		Urina 24 ore. Contenitore acquisibile presso farmacie.	8 Padova		Conservare 8 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 C°.
Bicarbonati (Idrogenocarbonato) Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.10.2_2** **1095d**	Elettrochimica / Gem Premier 5000 Werfen	Sangue intero venoso in siringa eparinata	1	Esecuzione con emogasanalizzatore	
Bilirubina reflex 1.Valore < 1 mg/dL eseguita solo bilirubina totale. 2. Valore > 1 esecuzione automatica di bilirubina diretta. **Nota:** è la prestazione richiedibile in routine per esterni ed interni.	**90.10.5_3** **new210r**	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Bilirubina reflex 1.Valore < 1 mg/dL eseguita solo bilirubina totale. 2. Valore > 1 esecuzione automatica di bilirubina diretta. **Nota:** richiedibile in urgenza solo da UO di Rovigo. Esecuzione analitica solo a Rovigo	**90.10.5_3** **nn210r**	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-nero, litio eparina			
Bilirubina totale Richiedibile in urgenza solo da UO di Adria e Trecenta	**211urg**	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-nero, litio eparina			
Bilirubina totale POCT	**211p**	Bilirubina ossidasi/ Piccolo De Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina urgenze			
Buprenorfina, dosaggio qualitativo Non utilizzabile per fini medico legali	**90.40.9_28** **new1263**	Immunoenzimatico/ Cobas 702 Roche, Adria	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	3		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°
Calcio totale (calcemia)	**90.11.4_2** **227**	Colorimetrico o-cresolftaleina/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Verde-nero, litio eparina urgenze	1		
Calcio totale POCT	**90.11.4_2** **227p**	Assorbanza Arsenazo III. Piccolo /de Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina			
Calcio totale urine (calciuria)	**90.11.4_3** **418**	o-cresolftalein	Urina 24 ore senza conservanti mantenuta in luogo fresco	1		

		a/ Cobas Roche.	durante la raccolta. Contenitore acquisibile presso farmacie			
Calcio ionizzato (ione), Ca++ Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.11.7_0** **new245**	Elettrochimica / Gem Premier 5000 Werfen	Sangue intero venoso in siringa eparinata refrigerata	1	Esecuzione con emogasanalizzatore	
Calcoli urinari ricerca qualitativa	**90.12.1_0** **new631**	Esame chimico	Calcoli, contenitore da urinocoltura. Acquisibile presso farmacie	18 Padova		.
Calcitonina Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.11.5_2** **7315**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.	Siero, rosso-giallo.	2		Centrifugare, sierare. Aliquota stabile 24 ore a 2-8 °C . Per tempi più lunghi conservare a -20 °C.
Calprotectina	**90.12.A_0** **797**		Feci contenitore standard con cucchiaio acquisibile presso le farmacie. Campione conservato a temperatura ambiente se consegnato il giorno della raccolta o refrigerato fino a 3 giorni e consegnato refrigerato	15 Padova		Conservare per tre giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 C°
Cannabinoidi, THC (delta-9-tetraidrocannabinolo): dosaggio qualitativo. Non utilizzabile per fini medico legali	**90.40.9_7** **new1253**	IIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas Roche, Adria	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine	3		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Carbamazepina **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.17.C_29** **new1239**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas 702 Roche	Siero, verde-giallo, litio eparina	2		
Catene leggere libere kappa e lambda. Immunoglobuline **Nota per il prescrittore**: prescrivere sempre entrambi i codici.	**90.28.7_2** **90.28.7_3** **new540**	Immunoturbidimetria. Optilite/ Binding Site	Siero, arancio-nero	9		
Catene leggere libere kappa e lambda. Immunoglobuline **Nota al prescrittore:** prescrivere sempre entrambi i codici	**90.28.7_4** **90.28.7_5** **new614**	Immunoturbidimetria. Optilite/ Binding Site	Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	9		
CEA (Antigene carcino embrionario)	**90.56.3_2** **new733**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Celiachia adulto: Immunoglobuline IgA totali anticorpi anti transglutaminasi IgG anticorpi anti transglutaminasi IgA Se positivi anticorpi anti endomisio. **Nota al prescrittore**: Non associabile ai codici dei singoli esami.	**90.47.X_0** **NN585A**	Vedi singoli esami	Plasma, verde-giallo, litio eparina Siero, rosso-giallo	20		
Celiachia bambino < 2 anni Immunoglobuline IgA totali	**90.47.Y_0** **NN585**	Vedi singoli esami	Plasma, verde-giallo, litio eparina Siero, rosso-giallo	20		

anticorpi anti transglutaminasi IgG anticorpi anti transglutaminasi IgA anticorpi anti gliadina deamidata IgG Se positivi anticorpi anti endomisio. **Nota al prescrittore**: Non associabile ai codici dei singoli esami.						
Ceruloplasmina (COE)	**90.12.5_0** **519**		Siero, giallo-giallo	16 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 3 giorni a 2-8 °C.
Ciclosporina A	**90.17.B_5** **new1205**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche, Adria	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA3 mL	4		Conservare campione tal quale 7 giorni a 2-8° C°. Per tempi più lunghi a – 20 C°.
Cistatina C	**90.13.A_2** **nn7391**		Siero blu-giallo	10 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 8 giorni a 2-8 °C
Citologia urinaria (Esame citologico per ricerca cellule neoplastiche) **Nota al prescrittore:** Il codice comprende 3 campioni	**91.39.4_0** **7951**		Urine. Contenitori con conservante metanolo forniti dai Centri Prelievi Aziendali. Test di competenza UOC Anatomia Patologica	15		
CK (CPK o Creatinchinasi) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.15.4_2** **291**	IFCC/ Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Verde-nero, litio eparina urgenze	1		
Cloro	**90.13.3_2** **225**	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Verde-nero, litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Cloro urinario	**90.13.3_4** **414**	ISE indiretto/ Cobas Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	1		
Clozapina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.	**90.17.B_43** **new7041**		Siero, blu-giallo	10 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 3 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi a – 20 C°
Cocaina Non utilizzabile per fini medico legali	**90.40.9_9** **new1255**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas, Roche, Adria	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine	2		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Colesterolo totale	**90.14.3_0** **255**	CHOD/POD/ Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Colesterolo HDL	**90.14.1_0** **257**	enzimatico/ colorim. diretto/ Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Colesterolo LDL diretto	**90.13.C_0** **new261**	Metodo diretto enzimatico colorimetrico in fase	Plasma, verde verde-giallo, litio eparina	1		

		omogenea. Cobas 702 Roche CV%: 2.1				
Colinesterasi (CHE) (Pseudocolinesterasi)	**90.14.4_0** **305**	Substrato butirriltiocolina Cobas Roche CV%: 1.9	Plasma, verde verde-giallo, litio eparina	1		
Complemento C3	**90.60.2_3** **529**	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria	Siero, rosso-giallo	1		
Complemento C4	**90.60.2_5** **531**	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria	Siero, rosso-giallo	1		
Complemento (C1 esterasi inibitore quantitativo)	**90.60.1_2** **nn521**		Siero, arancio-nero	15 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 8 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 °C
Copeptina	**90.04.1_3** **new7313**		Siero, blu-giallo	10 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 24 h a 2-8 °C, per periodi più lunghi a -20°C
Coombs Indiretto (anticorpi anti eritrociti nel plasma)	**90.49.3_0** **7809**		Plasma, viola-nero, K2 EDTA 6mL Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale			
Coombs diretto (anticorpi anti eritrociti adesi alle emazie)	**90.58.2_0** **7807**		Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA 6 mL. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale			
Corticotropina (ACTH) Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo Non è possibile eseguire solo prelievo 16-18. In caso di richiesta abbinata delle ore 8 e 16-18 il prelievo delle 16-18 è effettuato ai poliambulatori di Adria e Rovigo i quali provvederanno ad inviare la provetta in Laboratorio.	**90.15.2_2** **7027 (ore 8)** **90.15.2_3** **7029 (ore 16 -18)**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL.	6	Usare provetta prerefrigerata a 2-8 °C. Centrifugare con centrifuga refrigerata e sierare. Conservare l'aliquota refrigerata.	Centrifugare con centrifuga refrigerata e sierare. Stabilità aliquota 3 ore a 2-8°C. Per periodi più lunghi conservare a -20°C
Cortisolo salivare mattino (ore 8.00) Richiedibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.15.3_6** **743s**		Saliva, dispositivo Salivette disponibile, negli orari di apertura, presso Centri Prelievi Ospedalieri e casa di comunità di Rovigo unitamente alla modalità della raccolta saliva. Il campione può essere conservato in frigorifero fino al massimo di 3 giorni	15 Padova		Centrifugare la salivette a 3000 giri/min per 10 minuti; la salivette centrifugata va conservata a + 4° fino a 3 giorni ; Per tempi più lunghi conservare a -20°C
Cortisolo salivare sera (ore 23.00) Richiedibile da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.15.3_7** **743ss**		Vedi Cortisolo salivare mattino	15 Padova		Vedi cortisolo salivare mattino.
Cortisolo Prelievo eseguibile solo da UO, Centri	**90.15.3_2** **743 (ore 8)**	ECLIA Elettrochemiluminescenz	Plasma , verde-giallo	2		

Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo Non è possibile eseguire solo prelievo 16-18. In caso di richiesta abbinata delle ore 8 e 16-18 il prelievo è effettuato solo ai poliambulatori di Adria e Rovigo i quali provvederanno ad inviare la provetta in Laboratorio.	**90.15.3_3** **745 (ore 16 - 18)**	a. Cobas Roche.				
Cortisolo urinario (cortisoluria)	**90.15.3_4** **7504**		Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	20 Padova		Conservare 7 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi conservare a -20°C
C Peptide basale - profilo digiuno	**90.11.1_2** **7015**		Siero, rosso-giallo.	12 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20 ° C
Creatinina con eGFR	**90.16.3_2** **207**	Enzimatico (creatinchinasi), Roche 702 Calcolo eGFR con formula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology): creatinina ed età paziente.	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Verde-nero, litio eparina urgenze	1		
Creatinina POCT	**90.16.3_2** **207p**	Spettrofotometria. Creatinina amidoidrolasi e Sarcosina ossidasi/ Piccolo De Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina urgenze			
Creatinina nelle urine	**90.16.3_3** **402**	Colorimetrico cinetico/ Cobas Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	1		
Creatinina clearance	**90.16.4_0** **400**	Calcolo	Plasma, verde-giallo, litio eparina routine contestualmente a Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta. E' refertata automaticamente anche creatinina, e cratininuria	1		
Crioagglutinine Prelievo eseguibile solo da UO e Centri Prelievi Ospedalieri di Adria, Trecenta e Rovigo	**90.46.3_0** **7811**		Siero, rosso-nero. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale		Consegna immediata al Centro Trasfusionale tenendo la provetta riscaldata	Consegna immediata al Centro Trasfusionale
Crioglobuline Prelievo eseguibile solo da UO e Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Rovigo	**90.61.1_0** **507**	Visivo	Siero, arancio-nero	7	Consegna immediata, tenendo la provetta riscaldata, ad un tecnico del	Immediato trattamento

					Laboratorio.	
Cromogranina A	**90.16.6_0** **7321**		Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL	23 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
CTX (Telopeptide C-terminale del collagene di tipo I)	**90.41.6_2** **new7387**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche Adria.	Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL	10		Centrifugare e conservare 8 giorni a 2- 8°C
Cyfra 21-1	**90.61.3_0** **7337**		Siero, rosso-giallo	14 Mestre		
Dabigatran ECT (Tempo di Ecarina) Richiedibile in urgenza solo da UO. Richiedibile in routine solo per pazienti con prescrizione effettuata presso ambulatori ospedalieri. Esecuzione analitica solo a Rovigo.	**90.63.8_2** **new1139**	Cromogenic o anti fatt II, Tempo di Ecarina (ECT) STAR R Max 3 STAGO.	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
D-dimero	**90.61.4_0** **1109**	Immunoturbi dimetria STAR R Max 3 STAGO. CV%: 9	Plasma, azzurro-nero. sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
D-dimero POCT	**90.61.4_0** **1109pp**	Immunofluor escenza AQT 90 De Mori	Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Delta 4 androstenedione (Androstenedione)	**90.17.3_0** **7033**		Siero, rosso-giallo	17 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2- 8°C
Deidroepiandrosterone solfato (DEA solfato, DHEA-solfato)	**90.17.2_0** **7005**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche Adria. CV%:15	Siero, rosso-giallo	6		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 14 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare a -20°C. Congelare una sola volta.
Diidrotestosterone DDOHT DHT	**90.17.5_0** **7325**		Siero, blu-giallo	22 Padova		Conservare 24 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20 °C
Digossina **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.17.C_31** **new1233**	KIMS Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo litio eparina Verde-nero litio eparina urgenze	1		
Edoxaban Richiedibile in urgenza solo da UO. Richiedibile in routine solo per pazienti con prescrizione effettuata presso ambulatori ospedalieri. Esecuzione analitica solo a Rovigo.	**90.63.1_4** **new1141**	Cromogenic o anti X attivato / STAR Max 3 STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Elettroforesi delle proteine sieriche (protidogramma) E' incluso il dosaggio delle Proteine totali	**90.38.4_0** **544**	Capillare/ Capillarys 3 Sebia	Siero, gialla-giallo	8		
Elettroforesi urinaria: non eseguita. **Nota al prescrittore**: Per valutare proteinuria non selettiva consigliato IgG urinaria. Per proteinuria selettiva: ACR (albumin, creatinine ratio).						

Per MGUS e/o Mieloma: Bence Jones						
Emocromo	**90.62.2_2** **1001**	Impedenza/ Ottico/ fluorescenza . Sysmex/ Dasit XN	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL	1		
Emocromo POCT	**90.62.2_2** **1001p**	Impedenziometria/ Micros ES 60/ Horiba	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL			
Emogas venoso Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**89.66_2** **1095**	Elettrochimica e parametri calcolati / Gem 5000 Premier Werfen	Sangue intero, Siringa eparinata.	1	Esecuzione con emogasanalizzatore conservando campione refrigerato fino all'esecuzione. In caso inoperabilità dell'emogas della Casa della Comunità il campione deve arrivare in Laboratorio entro 15 minuti dal prelievo.	Esecuzione immediata
Emogas arterioso Prelievo eseguibile solo presso UO Ospedaliere. Richiedibili per utenti esterni, con prenotazione CUP a 72 ore come visita pneumologia per emogasanalisi arterioso	**89.65.1_2** **1097**	Elettrochimica e parametri calcolati / Gem 5000 Premier Werfen	Sangue intero, Siringa eparinata.	1	Esecuzione con emogasanalizzatore conservando campione refrigerato fino all'esecuzione.	Esecuzione immediata
Emoglobina Glicata (HbA1c)	**90.28.1_0** **nn269**	Capillare/ Capillarys 3 /Sebia	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL	5		
Emoglobina A2 Emoglobina F Emoglobine anomale (HbS, HbC, altro)	90.66.7_2 **7901**		Sangue intero, viola-nero K2EDTA 3mL. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale	30		
Enzima di conversione dell' angiotensina (ACE).	**90.17.E_0** **7305**		Plasma, verde-giallo, litio eparina	14 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 8 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi a -20 °C
Eosinofili nasali Effettuabile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo.	**90.62.5_2** **1019**	Striscio, es. microscopico colorato con May Grunwald Giemsa	Muco nasale di ciascuna narice strisciato su 2 vetrini	2		
Epatite B (HBV) anticorpi anti HBsAg Richiedibile solo in urgenza da UO per: a) incidenti occupazionali solo per il lavoratore infortunato. b) espianto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale **Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**7827A**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL			
Epatite B HBsAg **Virus Epatite B (HBV) Antigene HBsAg** Richiedibile solo in urgenza da UO	**7823A**	ECLIA Elettrochemiluminescenza.	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL			

per: a) incidenti occupazionali b) espianto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale **Esecuzione analitica solo a Rovigo**		Cobas 801 Roche.				
Epatite B anti HBc (core) totale (IgG e IgM) Richiedibile solo in urgenza da UO per espianto d'organi e incidente occupazionale **Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**91.18.6_0** **7823R**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche.	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL			
Epatite C anticorpi **Virus Epatite C (HCV) anticorpi** Richiedibile solo in urgenza da UO per: a) incidenti occupazionali b) espianto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale **Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**7839A**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL			
Eritropoietina (EPO)	**90.18.5_0** **7309**		Siero, rosso-giallo	16 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
Estradiolo (E2) (17 beta estradiolo)	**90.19.2_2** **723**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche.Trec enta	Siero, blu-giallo. A Trecenta per PMA, verde-giallo	3		Centrifugare e conservare 2 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi sierare e conservare l'aliquota -20 °C. Congelare una sola volta.
Etanolo plasmatico (alcool etilico, alcolemia) Non utilizzabile per fini medico legali	**90.20.1_2** **1211**	Enzimatico/ alcool deidrogenas i Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Plasma, verde-nero urgenze			
Etanolo urinario Non utilizzabile per fini medico legali	**90.20.1_3** **1213**	Enzimatico/ alcool deidrogenas i Cobas 702 Roche	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Vedi per modalità di richiesta Benzodiazepine screening	1		
Etilglucuronato (ETG, Etilglucuronide)	**90.40.9_30** **new7199**		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	7 Padova		Conservare 2 giorni a 2-8°C.
Etosuccimide	**90.17.B_7** **new1215**		Siero, giallo-giallo	26 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 2-8°C.
Everolimus	**90.17.B_28** **new7401**		Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA	22 Padova		Conservare il campione 7 giorni a 2-8°C tal quale. Per tempi più lunghi a -20°C.
Fattore II Protrombina (mutazione G20210A); Fattore V Leiden (mutazione G1691A) Necessario Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL) **Nota al prescrittore:** prescrivere sempre entrambi i codici in un unica accettazione	**G1.91_4** **G 1.91_3** **new1124ii** **new1124v**	Biologia molecolare PCR Real Time/ GeneXpert/ Cephaid	Sangue intero, viola-nero K2 EDTA 3 mL. Esecuzione analitica UOSD Microbiologia. Validazione clinica e firma UOC Medicina di Laboratorio	20		

Fattore VIII Prelievo effettuabile solo presso UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo dal lunedì al venerdì	**90.64.3_5** **1191**		Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. 2 Provette.	28 Mestre		Doppia centrifugazione, sierare e conservare l'aliquota a – 20°C.
Fattore Reumatoide (RF, Reuma test, Waaler Rose reazione)	**90.64.2_0** **503**	Immunoturbidimetria	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Fenitoina (difenilidantoina) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.17.C_32** **new1235**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	2		
Fenobarbital **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.17.C_42** **new1237**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina Verde-nero urgenze	1		
Ferritina	**90.22.3_0** **709**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.	Plasma, verde-nero urgenze litio eparina	1		
Ferro (sideremia)	**90.22.5_2** **new237**	Ferrozina/ Cobas 702 Roche CV%: 1.5	Plasma, verde-nero, litio eparina	1		
Fibrinogeno	**90.64.6_0** **new1105**	Coagulativa-Clauss/ STAR Evolution STAGO. CV%: 5	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Folato (Acido Folico)	**90.23.2_2** **713**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Fosfatasi alcalina (ALP)	**90.23.5_0** **301**	Nitrofenilfosfato/ Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo (isofosfatasi)	**90.24.1_0** **303**		Siero, blu-giallo	20 Padova		Conservare 2 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare l'aliquota a -70 °C
Fosfato inorganico (fosfatemia, fosforo, P)	**90.24.3_2** **229**	ammonio molibdato/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Fosfato inorganico urinario (fosfaturia).	**90.24.3_4** **422**	ammonio molibdato/ Cobas 702 Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta.	1		
FSH (ormone follicolo stimolante, follitropina)	**90.23.3_2** **719**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601	Siero, blu-giallo	3		Centrifugare e conservare 14 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare l'aliquota

		Roche. Trecenta. CV%: 10				-20 °C Congelare solo 1 volta.
FT3 (Triiodotironina frazione libera) **Nota al prescrittore:** è il test da utilizzare in caso di esenzione patologia.	**90.43.3_0** **701**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche CV%: 8	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
FT4 (Tiroxina frazione libera) **Nota al prescrittore:** è il test da utilizzare in caso di esenzione patologica.	**90.42.3_0** **703**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche CV%: 8	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Gastrina 17 Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.26.1_3** **7307**		Siero, rosso-giallo	18 Mestre	Centrifugare entro 2 ore dal prelievo	Centrifugare entro 2 ore dal prelievo, sierare e conservar l'aliquota e a – 20°C
Gamma GT (gammaglutamiltranspeptidasi)	**90.25.5_2** **299**	IFCC/Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
GH (hGH, ormone somatotropo)	**90.35.1_2** **7007**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche, Adria	Siero, rosso-giallo	6		Centrifugare e conservare il siero: 8 ore a temperatura ambiente; 2-8 °C fino a 48 ore; -20 °C per 28 giorni (congelare una sola volta)
GH (hGH) ormone somatotropo curva dopo stimolazione ai minuti 0,60,120, salvo diversa indicazione del prescrittore. I diversi tipi di stimolo sono decisi dal medico prescrittore. Gli stimoli, tranne il glucosio, non verranno somministrati nei Centri prelievi. Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**I prelievo: vedi GH** **II prelievo** **90.35.1_3** **new7007ii** **III prelievo** **90.35.1_4** **new7007iii**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche, Adria	Siero, rosso-giallo	6		Conservare il siero: 8 ore a temperatura ambiente; 2-8 °C fino a 48 ore; -20 °C per 28 giorni (congelare una sola volta)
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione 0,30,60,90,120) I diversi tipi di stimolo sono decisi dal medico prescrittore. Gli stimoli, tranne il glucosio, non verranno somministrati nei Centri prelievi. Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.35.2_5** **7010**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche, Adria	Siero, rosso-giallo	6		Conservare il siero: 8 ore a temperatura ambiente; 2-8 °C fino a 48 ore; -20 °C per 28 giorni (congelare una sola volta)
Glucagone	**90.26.3_0** **7345**		Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL	22 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 24 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi, a – 20 °C.
Glucosio (glicemia) **Glucosio su liquor: vedi Liquor**	**90.27.1_2** **201** **201d: per distretti**	Esochinasi. Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina routine. Verde-nero litio eparina urgenze. Consegna entro 2 ore dal prelievo Grigio-bianco, fluoruro di sodio	1		

			(NaF) + K3EDTA (inibitore glicolisi) nei distretti e Case di Riposo. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Glucosio POCT	**90.27.1_2 201p**	Esochinasi Piccolo De Mori	Plasma, verde-nero litio eparina urgenze			
Glucosio curva dopo carico (OGTT). Adulti/bambini. 2 prelievi: base, 120 Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.26.5_2 nn204**	esochinasi/ Cobas Roche	Plasma, grigio-bianco Fluoruro di sodio + Potassio ossalato.	1		
Gravidanza. 3 prelievi: base, 60,120 Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.26.5_3 nn202b**	esochinasi/ Cobas 702 Roche	Plasma, grigia-bianco Fluoruro di sodio + Potassio ossalato.	1		
Glucosio curva dopo carico (OGTT). Curve particolari per bambini UO Pediatria 4 prelievi: base, 30, 60,120	**90.26.5_2 nn204**	esochinasi/ Cobas 702 Roche	Plasma, grigio-bianco, Fluoruro di sodio + Potassio ossalato.	1		
Glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH)	**90.27.2_0 321**		Sangue intero, verde-nero, litio eparina	15 Padova		Conservare 15 giorni la provetta, tal quale, a 2- 8°C
Gonadotropina corionica (beta HCG)	**90.27.5_2 715**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Plasma, verde-nero, litio eparina urgenze.	1		
Gonadotropina corionica libera (HCG frazione libera) e PAPP-A	**90.17.6_2 new791**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas Roche	Siero, blu-giallo	Referta to il martedì		Centrifugare e conservare 8 giorni a 2- 8°C
Gruppo sanguigno AB0 e Rh (Agglutinogeni e Agglutinine) Fenotipo Rh	**90.65.3_2 7801** **% TAB 90.64.4_0**		Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale			
HFE (genetica Emocromatosi) Necessario Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL).	**G1.0210_2 7908**		Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale			
HIV anticorpi Virus Immunodeficienza Acquisita (HIV 1-2) anticorpi e antigene p24 Richiedibile solo in urgenza da UO per: a) incidenti occupazionali b) espianto d'organi c) madri partorienti con stato sierologico non noto d) violenza sessuale **Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**7847A**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL			
Idrossiprogesterone (17 alfa idrossiprogesterone, 17 OH-P)	**90.01.2_0 7319**		Siero, rosso-giallo	14 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
IgA, IgG, IgM (immunoglobuline)	**90.69.4 500 IgA 90.69.4_7 537**	Immunoturbi dimetrico Cobas 702 Roche	Plasma, verde -giallo litio eparina	1		

	IgG **90.69.4_6** **533** **IgM** **90.69.4_5** **535**					
IgG urine	**90.69.4_3** **626**	Immunoturbidimetrico Cobas 702 Roche	Urine 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	2		
IgE specifiche Sono richiedibili come pannelli predefiniti, pannelli aperti e singolo allergene. Nel modulo in calce al CPL sono riportati dettagliatamente i codici regionali da usare e le modalità di prescrizione.	Pannello alimenti 1 **90.68.B_2** **760a** Pannello alimenti 2 **90.68.B_2** **762a** Pannello inalanti **90.68.B_2** **764a** Pannello farmaci **90.68.B_3** **766** Pannello imenotteri **90.68.B_3** **770** Pannello aperto **90.68.B_3** **772** Codice regionale per singolo allergene **90.68.1_0** **774**	Immunofluorimetria/ ImmunoCAP 250 Phadia Adria	Siero, rosso-giallo	20		Centrifugare e conservare a 2-8°C.
IgE totali	**90.68.3_0** **771**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Adria	Siero, rosso-giallo	2		Centrifugare e conservare 7 giorni a 2-8°C. Per tempi più lunghi sierare e conservare l'aliquota a -20°C.
Immunofenotipizzazione leuco/linfocitaria Fino a 8 antigeni. Pannello antigeni: CD3, CD4, CD8, CD16-56, CD19. Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo dal lunedì al venerdì; Per antigeni al di fuori di quelli elencati rivolgersi presso centri universitari.	**91.47.C_4** **7812**		Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA 3 mL. Test di competenza UOC Medicina Trasfusionale	15		Conservare campione tal qaule 24 ore a temperatura ambiente. I campioni del venerdì pomeriggio e dei giorni prefestivi devono arrivare in Centro Trasfusionale entro le ore 13.00.
Insulina (basale)	**90.29.1_2** **7021**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche	Siero, rosso-giallo	8		Centrifugare e conservare 48 ore a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare l'aliquota a – 20 °C.

Insulina (curva dopo carico di glucosio: base e 120). Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.28.5_3** **7023**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche. Adria	Siero, rosso-giallo	8		Vedi insulina
Insulina curva pediatrica dopo carico di glucosio. Curve particolari per bambini UO pediatria 5 prelievi: base, 30, 60,90,120	**90.28.5_3** **nn7023**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche.Adria	Siero, rosso-giallo	8		Vedi insulina
Ioduria	**90.27.6_0** **7225**		Urina, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie	30 Padova Semeio tica		Conservare a 2-8 °C.
Istamina	**90.42.B_3** **new7351**		Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL	37 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
JAK 2 mutazione Prelievo esegubile dal lunedì a giovedì solo da UO e Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo Necessario Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL) **Attenzione:** test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	**G1.91_15** **new230** **Vedi nota amministrat ivi** BCR/ABL qualitativo.		Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 6 mL, 3 provette	40 IOV	Conservare refrigerato	Conservare 24 ore campione tal quale a 2-8 C°
LAC (lupus anticoagulant) Lac (Anticoagulante Lupus-Like)	**90.46.5_2** **90.46.5_3** **1121**	Viscosimetri co dRVVT SCT /Sta Compact Max 3/ STAGO. Adria	Plasma, azzurro-nero, Sodio citrato, 2 provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15		Doppia centrifugazione . Sierare e conservare l'aliquota a – 20 °C. Vedi PO/MLAB/06
Lamotrigina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	**90.17.B_33** **new7361**		Siero, arancio-nero	22 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8°C.
Lattato deidrogenasi (LDH) **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.29.2_2** **297**	IFCC (Lattato Piruvato) / Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Plasma, verde-nero, litio eparina	1		
Levetiracetam LEA solo per residenti Regione Veneto. Per utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	**90.17.B_40** **new7369**		Siero, arancio-nero	17 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8°C.
LH (ormone luteostimolante, luteotropina)	**90.32.3_2** **new721**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 601 Roche.Trec enta	Siero, blu-giallo	3		Centrifugare e conservare per 14 giorni a 2-8°C.
Lipasi	**90.30.2_2** **309**	Substrato trigliceride/a cido glutarico-metil resorufina/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		

Lipoproteina (a)	**90.30.3_0** **527**		Siero, arancio-nero	10 Padova		Centrifugare e conservare 6 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi sierare e conservare l'aliquota a – 20 °C.
Liquido articolare/sinoviale: aspetto, colore, pH, densità, coagulazione, proteine totali, cristalli. Leucociti, eritrociti. Richiedibile solo dal lunedì al giovedì	**90.32.1_0** **691**		Liquido articolare. N. 2 Tappo bianco-nero senza additivi da 4 mL e viola-nero K2 EDTA 3 mL	7 Padova		Conservare 1 giorno provette tal quali a 2-8 °C.
Liquido di dialisi peritoneale: leucociti totali e % PMN e MN. Nota al prescrittore: esami aggiungibili a dialisi perit. Urea 90.44.1_8 Creatinina 90.16.3_12 Glucosio 90.27.1_8 Proteine totali 90.38.5_6 Richiedibile sola da UO ospedaliere	**90.30.4_6** **2009dia**	Vedi singoli test	Liquido di dialisi. Bianco-nero senza additivi da 4 mL e viola-nero K2 EDTA 3 mL	2		
Liquido pericardico: Aspetto, colore, pH, proteine totali, LDH. Leucociti Richiedibile sola da UO ospedaliere	**90.30.4_10** **2007**	vedi singoli test	Liquido pericardico. Bianco-nero senza additivi da 4 mL e viola-nero K2 EDTA 3 mL	2		
Liquido peritoneale: aspetto, colore, pH, proteine totali, LDH Leucociti Richiedibile sola da UO ospedaliere	**90.30.4_11** **2009**	vedi singoli test	Liquido peritoneale. Bianco-nero senza additivi da 4 mL e viola-nero K2 EDTA 3 mL	2		
Liquido pleurico: aspetto, colore, pH, proteine totali , LDH. Leucociti Richiedibile sola da UO ospedaliere	**90.30.4_12** **2011**	vedi singoli test	Liquido pleurico. Bianco-nero senza additivi da 4 mL e viola-nero K2 EDTA 3 mL	2		
Liquor chimico fisico e microscopico (aspetto, torbidità proteine, glucosio, leucociti, acido lattico). **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.30.4_4** **1331**	Vedi singoli test. Per leucociti: lettura automatizzata Sysmex XN o microscopia ottica.	Liquor, bianco-nero senza additivi da 4 mL. Richiedibile solo in urgenza da UO. **Nota:** il test Beta Trace Protein, eseguito a Padova, è utile nell'ipotesi di fistola liquorale per distinguere una rinorrea liquorale da secrezione nasale			
Litio **Richiedibile in urgenza da tutte le UO. Esecuzione analitica solo a Rovigo**	**90.32.2_0** **1221**	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 702 Roche.	Siero, rosso	1		
LUE Screening/Sifilide Richiedibile in urgenza solo per espianto **Esecuzione analitica solo a Rovigo**	91.10.B_2 **7631A**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche. Rovigo	Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL			
Magnesio totale	**90.32.5_2** **231**	blu di xilinile/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde chiaro-giallo litio eparina	1		
Magnesio totale urinario	**90.32.5_5** **426**	blu di xilinile/ Cobas 702 Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta	1		
Malaria	**91.05.C_0**	Immunocro	Sangue intero, viola-nero,			

	1051	matografico BinaxNow Malaria	K2EDTA 3 mL			
Metadone Non utilizzabile per fini medico legali	**90.40.9_25** **new1259**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas Roche, Adria	Urina estemporanea, vasetto sterile giallo.	3		
Metanefrine urinarie (Metanefrina Normetanefrina) **Nota al prescrittore**: prescrivere sempre entrambi i codici.	**90.33.6_2** **90.33.6_4** **new7216p**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Mantenere refrigerato durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci	32 Mestre		Conservare a 2-8 °C
Methotrexate, Metotrexato	**90.17.C_43** **new1249**		Siero, arancio-nero	9 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
Mioglobina	**90.33.5_2** **281**	.	Plasma, verde-nero, litio/eparina	3 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 8 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	**90.18.4_0** **7301**		Siero, rosso-giallo	15 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
Omocisteina Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.34.6_0** **7343**	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 702 Roche	Siero, rosso-giallo.	2	Centrifugazione immediata	Immediata centrifugazione. Sierare e conservare a 2-8°C per 4 settimane.
Oppiacei, dosaggio qualitativo. Non utilizzabile per fini medico legali.	**90.40.9_21** **new1261**	KIMS: Interazione cinetica di micro particelle in soluzione. Cobas Roche, Adria	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	3		Conservare 5 giorni a 2- 8 °C. Per tempi più lunghi conservare a – 20 C°.
Osmolalità plasmatica diretta **Osmolalità plasmatica calcolata (solo in urgenza Adria e Trecenta)**	**90.34.7_2** **271** **279**	Abbassamento del punto di congelamento/ Osmo Pro/ De Mori Adria e Trecenta, in urgenza, calcolata. Cobas/ Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Verde-nero litio eparina urgenze	1		
Osmolalità urinaria	**90.34.7_3** **1301**	Abbassamento del punto di congelamento/Osmo Pro/ De Mori	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie	1		

Osteocalcina (BGP)	**90.35.4_2** **new7003**		Siero, blu-giallo	10 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota 3 giorni a 2-8 °C, per tempi più lunghi a -20°C
Ossalati (Ossalato, Acido ossalico)	**90.35.3_0** **444**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Evitare da due giorni precedenti e per tutto il tempo della raccolta cibi ricchi in ossalati come cipolle, fragole, pomodori, prezzemolo, rabarbaro e spinaci	22 Mestre		Conservare a 2-8 °C
Paratormone (PTH) intatto PTH intraoperatorio: richiedibile solo da UO previo accordo con Laboratorio	**90.35.5_2** **new7001**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801, Roche.	Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL	2		Conservare 1 giorno provetta tal quale a temperatura ambiente
Peptide natriuretico Cerebrale (NT- Pro BNP)	**90.36.6_0** **287**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas Roche.	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Piastrine in citrato	**90.62.2_3** **1003c**	Impedenzio metrico/ Ottico/ Fluorescenz a. Sysmex XN Dasit	Sangue intero, azzurro-nero, sodio citrato, Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Piombo ematico	**90.36.3_2** **7367**		Plasma, verde-nero, litio eparina. Conservare campione refrigerato. Non centrifugare	13 Padova Tossico logia Industri ale		Conservare a 2-8 °C senza centrifugazione
Piombo urinario	**90.36.3_3** **7227**		Urine raccolta 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Conservare a –20°C	13 Padova Tossico logia Industri ale		Conservare a -20°C
Polipeptide pancreatico	**90.36.5_3** **7349**		Siero, blu-giallo. Campione refrigerato	37 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
Porfirine totali Sono refertate anche le uroporfirine.	**90.37.1_2** **90.37.1_3** **443**		Urina 24 ore, contenitore con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Tenere campione refrigerato, al buio, avvolto da carta stagnola	17 Padova	Tenere campione refrigerato, al buio, avvolto da carta stagnola	Conservare a -20°C.
Potassio	**90.37.4_2** **223**	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina. Verde-nero litio eparina urgenze. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Potassio POCT	90.37.4_2 **223p**	Spettrofoto metrico. Piruvato chinasi e LDH/ Piccolo De Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina			
Potassio urinario	90.37.4_3 **410**	ISE indiretto/ Cobas Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere in luogo fresco durante la raccolta	1		

Prealbumina (PALB, Transtiretina)	**90.37.6_2 515**	Immunoturbidimetrico Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Procalcitonina Richiedibile solo in urgenza da UO e Ospedali di Comunità	**90.38.Z_2 nn795**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche.	Plasma, verde-nero, litio eparina			
Progesterone	**90.38.1_0 725**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta	Siero, blu-giallo	3		Centrifugare sierare e conservare 5 giorni a 2-8 °C.
Prolattina (HPRL)	**90.38.2_2 new727**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta	Siero, blu-giallo	3		Centrifuagre sierare e conservare 14 giorni.
Prolattina seriata (HPRL). Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo con mantenimento di unico accesso venoso tramite applicazione di soluzione fisiologica per i due punti seriali successivi. Eseguita tempistica 0 (basale) 15, 30 minuti salvo diversa indicazione del prescrittore.	**I prelievo: vedi prolattina** **II prelievo 90.38.2_3 new727ii** **III prelievo 90.38.2_4 new727iii**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	Siero, blu-giallo	3		Centrifugare, sierare e conservare 14 giorni
Proteina cationica degli eosinofili (ECP) Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.68.6_0 new7339**		Siero, arancio-nero	20 Mestre		Entrifugare e sierare tra la seconda e terza ora dal prelievo e conservare l'aliquota a - 20°C
Proteina C anticoagulante funzionale	**90.72.2_0 1113**	Cromogenica/ STAR Evolution STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	2		
Proteina C Reattiva (PCR)	**90.72.3_2 573**	immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo litio eparina. Verde-nero litio eparina urgenze	1		
Proteina C Reattiva (PCR) POCT	**90.72.3_2 573p**	Immunodosaggio al lattice. Piccolo/De Mori	Plasma, verde-nero litio eparina			
Proteina S free (libera) anticoagulante	**90.72.4_0 1115**	Immunoturbidimetria (espressa come % di presenza) / STAR Evolution STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	2		
Proteine totali **Proteine totali su liquor: vedi liquor**	**90.38.5_2 209**	Colorimetrico, Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo. litio eparina. Verde-nero litio eparina urgenze	1		
Proteine totali urine (Proteinuria)	**90.38.5_4**	Turbidimetri	Urina 24 ore, contenitore senza	1		

	600	co con Benzetonio cloruro/ Cobas 702 Roche	conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato il campione durante la raccolta			
Protoporfirina IX eritrocitaria	**90.39.2_0** **7395**		Plasma, verde-nero, litio eparina	10 Padova Tossicologia Industriale		Non centrifugare. La provetta va avvolto in carta stagnola.
PSA Reflex (Antigene prostatico specifico). Il PSA libero è misurato automaticamente quando il PSA tot. è tra 2.5 e 10 mcg/L	**90.56.9_0** **new724**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Rame (cupremia)	**90.39.4_2** **233**		Siero, giallo-giallo	14 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20 °C
Recettore solubile della transferrina (TfR)	**90.39.6_0** **7373**		Siero, rosso-giallo	7 Padova		Centrifugare, Sierare e conservare l'aliquota 6 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a -20°C
Renina Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo I	**90.40.2_3 basale/ ortostatismo** **755** **90.40.2_2 clinostatismo** **757**	Immunochemiluminescenza/Maglumi Medical Systems	Plasma, viola-nero, K2EDTA 6 mL.	15	**Abbinata clino/ ortostatismo:** il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato con utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare quindi il prelievo in ortostatismo (da seduto). Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5 Centrifugare, sierare e conservare poi l'aliquota a 2-+8 °C	Centrifugare, sierare subito e conservare l'aliquota a -20°C.
Resistenza alla Proteina C Attivata (APCR)	**90.77.2_0** **1193**	Viscosimetrico/ Sta Compact Max 3/STAGO Adria	Plasma, azzurro-nero. sodio citrato. 2 Provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15		Doppia centrifugazione . sierare e conservare l'aliquota a a – 20 °C.
Reticolociti Richiedibile in urgenza solo nel protocollo TTP.	**90.74.5_0** **1011**	Citometria a flusso in fluorescenza /Sysmex XN	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL	1		
Rivaroxaban Richiedibile in urgenza solo da UO. Richiedibile in routine solo per pazienti con prescrizione effettuata presso ambulatori ospedalieri.	**90.63.1_5** **new1137**	Cromogenico anti X attivato/ STAR R Max 3 STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo			

Esecuzione analitica solo a Rovigo						
Sangue occulto nelle feci	**90.21.4_2** **8001 (1° campione)** **90.21.4_3** **8002 (2° campione)** **90.21.4_4** **8003 (3° campione)**	Immunologico al lattice turbidimetrico Pledia/Dasit Trecenta	Feci, contenitore dedicato con liquido di conservazione disponibile, negli orari di apertura, presso i Centri Prelievi. In caso di raccolta di 3 campioni, devono essere consegnati contemporaneamente. Le 3 raccolte possono essere anche dello stesso giorno. Campioni conservati per massimo 7 giorni in frigorifero	4		
Sangue occulto screening CCR	**Codice legato alla programmazione regionale**	Immunologico al lattice turbidimetrico Pledia/Dasit. Trecenta	Feci. Contenitore dedicato con liquido di conservazione fornito dalla farmacie su invito della programma regionale dello screening CCR. Campione conservato per massimo 7 giorni in frigorifero			
Schistociti (conta) Richiedibile solo per UO ospedaliere in routine e, in urgenza, solo nel protocollo TTP.	**90.62.2_5** **nn1100s**	Microscopia	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL	1		
Serotonina urine (5-idrossitriptamina, 5- HT)	**90.03.6_11** **new7204**		Urina 24 ore, contenitore 24 ore e flaconcino con HCl al 16% da versare nel contenitore prima della raccolta, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri e casa di comunità di Rovigo. Mantenere refrigerato durante la raccolta	22 Padova		Conservare a -20°C
SHBG (globulina di trasporto ormoni sessuali)	**90.25.7_0** **7365**		Siero, rosso-giallo	14 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8 °C.
Sirolimus (Rapamicina)	**90.17.B_27** **new7393**		Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA 3 mL Conservare il campione refrigerato	10 Padova		Conservare 7 giorni a 2-8°C la provetta tal quale. Per tempi più lunghi sierare e conservare aliquota a -20°C
Sodio	**90.40.4_2** **221**	ISE indiretto/ Cobas Roche	Plasma, verde -giallo litio eparina routine. Verde-nero litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Sodio POCT	**90.40.4_2** **221p**	ONPG e beta galattosidasi / Piccolo De Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina urgenze			
Sodio urinario	**90.40.4_4** **406**	ISE indiretto/ Cobas Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Campione mantenuto in luogo fresco durante la raccolta	1		
Somatomedina C (Igf-1)	**90.40.7_2** **new7303**		Siero, rosso-giallo	14 Padova		Centrifugare, sierare e conservare aliquota a 2-8 °C.
Somatostatina	**90.35.6_0** **new7347**		Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL	37 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
Striscio periferico (Esame microscopico del sangue periferico). **Nota al prescrittore esterno**: Specificare nell'impegnativa con emocromo la richiesta dello striscio.	**new1100**	Microscopia robotizzata con colorazione May Grunwald Giemsa	Sangue intero, viola-nero, K2 EDTA 3 mL	2		
Tacrolimus (FK 506)	**90.17.B_26** **new1245**		Sangue intero viola-nero, K2 EDTA 3 mL	5 Padova		Conservare 7 giorni a 2-8°C la provetta tal quale. Per tempi

						più lunghi sierare e conservare aliquota a -20°C.
TAS (ASLO, Anticorpi anti streptolisina O)	**91.08.5_0 505**	Immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde chiaro-giallo, litio eparina	1		
Teicoplanina Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.17.C_20 new1243**	Immunoturbidimetria, Tema, distributore di Thermo Scientific Cobas 501 Roche, Adria.	Siero, rosso-giallo	2	Centrifugare e sierare; conservare poi l'aliquota a 2-8 °C.	Centrifugare e sierare subito; conservare l' aliquota a 2-8 °C.
Tempo di protrombina (PT) INR	**90.75.4_0 1101**	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Tempo di protrombina INR POCT	**90.75.4_0 1101pp**	Foto ottico/ Hemocrom CREMASCOLI	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Tempo di protrombina INR POCT-MGI	**90.75.4_0 1101pp**	Fluorescenza in microfluidica. Platform/ LumiraDX. Biomedical Service	Sangue capillare			
Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT)	**90.76.1_0 1103**	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1		
Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) POCT	**90.76.1_0 1103pp**	Foto ottico / Hemocrom CREMASCOLI	Plasma, azzurro-nero, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo			
Teofillina	**90.17.C_33 new1225**		Siero, giallo-giallo	15 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a 2-8 °C.
Test di gravidanza	**90.27.3_1 new649**	Immunocromatografico su card: ricerca HCG	Urina estemporanea, vasetto sterile. Acquisibile presso farmacie	1		
Test di gravidanza POCT	**90.27.3_0 649p**	Immunocromatografico su card: ricerca HCG	Urina estemporanea, vasetto sterile			
Testosterone libero	**90.41.3_3 new7031**		Siero, blu-giallo	17 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l'aliquota a -20°C
Testosterone totale	**90.41.3_2 new731**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta	Siero, blu-giallo	3		Centrifugare, e conservare 7 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi Sierare e conservare l'aliquota a -20 °C.
Tipizzazione genomica Locus DQA1 e DQB1, Alta risoluzione Necessario Modulo consenso informato per analisi genetiche (in calce al CPL)	**90.80.2_0 90.80.4_0 572**	Biologia molecolare	Sangue intero, viola-nero, K2EDTA 3 mL	15 Padova		Conservare campione tal quale 7 giorni +2 +8° C.
Tipizzazione delle Componenti Monoclonali (Inclusa, in automatico, elettroforesi sierica e proteine totali)	**90.69.2_2 new543**	Capillare immunosottrazione	Siero, giallo-giallo	8		

		Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia (immunofissazione) La tecnica è decisa dal laboratorio in base alla tipologia della componente monoclonale				
Tireoglobulina (Tg)	**90.41.5_0** **7013**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	Siero, rosso-giallo	8		Sierare e conservare 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi Sierare e conservare l'aliquota a -20 °C.
Tireoglobulina su aspirato: richiedibile solo da UO previo accordo con Laboratorio	**7013asp**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	Liquido da aspirato, rosso-giallo			
Topiramato LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	**90.17.C_7** **new1247**		Siero, blu elettrico	8 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l' aliquota 3 giorni a 2-8 °C. Per tempi più lunghi a – 20 C°.
Transferrina	**90.42.5_2** **247**	Turbidimetrico/ Cobas 702 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Transferrina Desialata, Carboidrato Carente (CDT)	**90.42.6_0** **new7355**		Siero, blu-giallo	15 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l' aliquota a -20° C. Se campione eccessivamente emolizzato o itterico richiamare l'utente.
Saturazione della transferrina **Nota al prescrittore** il codice SATTRANSF comprende ferro **90.22.5_2** e transferrina **90.42.5_2**	**SATTRANSF** **new240**	Vedi singoli test. Calcolo	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Trigliceridi	**90.43.2_0** **253**	Glicerolo-chinasi-POD/ Cobas Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Triptasi	**90.42.B_2** **new7035**	Immunofluorimetria/ ImmunoCAP 250 Phadia Adria	Siero, rosso-giallo	20		Conservare a 2-8°C.
Troponina T hs Richiedibile solo in urgenza da UO e Ospedali di Comunità	**90.82.3_0** **283**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche CV%: 10 al cutoff	Plasma, verde-nero, litio eparina urgenze.			
Troponina T POCT. **Ad Adria il test è eseguito H24**	**90.82.3_0** **283pp**	Immunofluorescenza/ AQT 90 De Mori	Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL			
TSHR, (Anticorpi anti recettore TSH, TRAb, TSI)	**90.53.5_0** **7353**		Siero, rosso-giallo	14 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare

						aliquota a -20°C
TSH **Nota al prescrittore**: è il test da utilizzare in caso di esenzione patologia.	**90.42.1_0** **705**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche.	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
TSH Reflex 1.Se TSH ≥ 0.45 mU/L e ≤ 3.5 refertato solo TSH. 2. Se TSH < 0.45 o > 3.5 esecuzione automatica di FT4. 3.Se TSH < 0.45 e FT4 è inferiore al limite superiore dell' intervallo di riferimento, esecuzione automatica di FT3. **Nota al prescrittore**: Non associabile ai singoli codici del TSH, FT3 e FT4. Non utilizzare in caso di esenzione patologia.	**90.41.8_0** **new705**	ECLIA Elettrochemi luminescenz a. Cobas 801 Roche.	Plasma, verde -giallo, litio eparina	1		
Urato (Acido urico, Uricemia)	**90.43.5_2** **251**	Uricasi e perox Cobas 702 Roche CV%: 1.3	Plasma, verde -giallo, litio eparina	1		
Urato urine (Uricuria, Acido urico urinario)	**90.43.5_4** **430**	uricasi e perox Cobas Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere campione in luogo fresco durante la raccolta	1		
Urea (Azotemia)	**90.44.1_6** **new205**	enzimatico/ Cobas 702 Roch	Plasma, verde -giallo, litio eparina. Verde- nero litio eparina urgenze	1		
Urea urine (Azoturia)	**90.44.1_3** **434**	Enzimatico/ Cobas 702 Roche	Urina 24 ore, contenitore senza conservati. Acquisibile in farmacia. Mantenere campione in luogo fresco durante la raccolta	1		
Urea (Azotemia) POCT	**90.44.1_6** **205p**	Ureasi, GLDH/ Piccolo De Mori	Plasma, verde-nero, litio eparina urgente			
Urine esame completo	**90.44.3_0** **1501**	Riflettanza, esame microscopic o del sedimento a lettura automatizzat a	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. In caso di richiesta di esame urine + urinocoltura è sufficiente questo stesso unico vasetto. Acquisibile in farmacia. Consegna entro 4 ore dal prelievo. In urgenza non è effettuato l'esame microscopico del sedimento. Esame chimico: UOSD Microbiologia. Visione sedimento UOC Medicina di Laboratorio	1		
Urine POCT	**90.44.3_0** **1320**	Riflettanza	Urina estemporanea, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione			
Vancomicina	**90.17.C_4** **new1241**	Immunoturbi dimetrico, Cobas 501 Roche, Adria	Plasma, viola-nero, K2EDTA 3 mL	1		Centrifugare, sierare e conservare aliquota 14 giorni a 2-8 °C.
VES (Velocità di eritrosedimentazione)	**90.82.5_0** **1013**	Fotometria capillare quantitativa/ Test 1, Alifax	Sangue intero, viola-bianco, K2EDTA	1		

VIP (Polipeptide intestinale vasoattivo) Prelievo eseguibile solo da UO, Centri Prelievi Ospedalieri di Adria e Trecenta e Casa di Comunità di Rovigo	**90.36.5_2** **7317**		Plasma, viola-nero, K2 EDTA 3 mL. Mantenere refrigerato	37 Padova	Centrifugare, sierare e conservare a 2-8 °C	Centrifugare, sierare immediatamente a 2-8 °C, e conservare l' aliquota a 2-8 °C
Vitamina B12 attiva (Cobalamina)	**90.13.5_3** **new711**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Vitamina D (25-idrossicolecalciferolo, 25-idrossivitamina D)	**90.44.6_2** **new7331**	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche	Plasma, verde-giallo, litio eparina	1		
Vitamina E	**90.45.2_3** **7329**		Siero, blu-giallo	15 Padova		Centrifugare, sierare e conservare l' aliquota a -20°C
Zinco	**90.45.4_2** **235**		Siero, giallo-giallo	18 Mestre		Centrifugare, sierare e conservare l' aliquota 5 giorni a 2-8 °C.

REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA	**Modulo prescrizione IgE Specifiche (Allergeni)** UOC Medicina di Laboratorio	

DATI DEL PAZIENTE:

COGNOME _____ **NOME** _____ **DATA DI NASCITA** _____

MEDICO PRESCRITTORE_____

Modulo utilizzabile a discrezione del prescrittore, accompagnato dall'impegnativa, per agevolare la prescrizione.

PANNELLI PREDEFINITI

Sono previsti **5** pannelli predefiniti:
- utilizzando il codice **90.68.B_2** è sempre necessario specificare in Quesito diagnostico dell'impegnativa se il pannello scelto è per alimenti o inalanti
- utilizzando il codice **90.68.B_3** è sempre necessario specificare in Quesito diagnostico se il pannello scelto è farmaci o imenotteri

Un pannello predefinito corrisponde a n°1 prestazione da CVP.

□ **1. Pannello alimenti 1**
(bambini <6 mesi):
f1 albume
f233 Gal d1 (Ovomucoide)
f76 Bos d4 (alfa- lattoalbumina)
f77 Bos d5 (beta - Lattoglobulina)
f78 Bos d8 (caseina)
f3 pesce (merluzzo)
f4 Grano
f14 soia
f17 nocciola

□ **2. Pannello alimenti 2**
(adulti e bambini > 6 mesi):
f1 albume
f2 latte
f3 pesce
f4 grano
f13 arachidi
f14 soia
f24 gambero
f439 Cor a 14 (Nocciola)
f440 Cor a 9 (nocciola)
f419 Pru p1 (Rosaceae)
f420 Pru p3 (Rosaceae)
f421 Pru p4 (Profilina)

□ **3. Pannello inalanti**
(bambini ed adulti):
g205 phl p1 (Graminaceae)
g215 phl p5b (Graminaceae)
t215 bet v1 (Betullaceae)
t216 bet v2 (Profilina)
t224 Ole e1 (Oleaceae)
w231 Art v1 (artemisia-Assenzio)
w211 Par j 2 (parietaria)
d1 Dermatophagoides pteronyssus
d2 Dermatophagoides farinae
e1 Epitelio di gatto
e5 epitelio di cane
m6 alternaria

□ **4. Pannello Imenotteri**
i1 Ape
i3 Vespa (Vespula spp) (Giallone)
i4 Polistes spp (Vespa)
i77 Polistes dominulus (vespa europea)
i75 Calabrone (Vespa cabro)
i205 Bombo
i208 Api m1
i217 Api m10
i211 Ves v1
i209 Ves v5
i210 Pol d5
Ro214 MUXF3 CCD bromelina

□ **5. Pannello Farmaci**
c1 Penicilloyl G
c2 Penicilloyl V
c5 Ampicillina
c6 Amoxicillina
c202 Succinilcolina
c7 Cefaclor

REGIONE DEL VENETO
ULSS5 POLESANA

Modulo prescrizione IgE Specifiche (Allergeni)

UOC Medicina di Laboratorio

PANNELLO APERTO

Il pannello aperto permette di prescrivere fino a 12 allergeni e corrisponde a n°1 prestazione.
Il codice regionale è **90.68.B_3** ed è necessario specificare i 12 allergeni scelti in Quesito diagnostico dell'impegnativa o utilizzando il modulo riportato sotto.

SINGOLO ALLERGENE

Per la richiesta di un singolo allergene utilizzare il codice generico **90.68.1_0**. Questo codice va riportato per ogni allergene richiesto (fino a max. 8 per impegnativa) Tutti gli allergeni richiedibili sono riportati sotto divisi per categorie e vanno specificati in Quesito diagnostico dell'impegnativa o utilizzando il modulo riportato sotto.

ACARI

☐ d70 acarus	☐ d202 nDer p 1 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.
☐ d1 dermatophagoides pt.	☐ d203 rDer p 2 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)
☐ d2 dermatophagoides far.	
☐ d209 Der p23 Acaro della polvere domestica	☐ **d71 Lepidoglyphus destructor (Storage mite)**
☐ d205 rDer p 10 Tropomyosin, House dust mite (Dermatoph. P.)	☐ **d73 Glycyphagus domesticus (Storage mite)**

ALBERI

☐ t1 Acero	☐ **t225 rBet v 6 Birch (Betula verrucosa)**
☐ t3 Betulla	☐ **t226 nCup a 1 Cypress (Cupressus arizonica)**
☐ t215 Bet v1	☐ **t227 nOle e 7 Olive (Olea europaea)**
☐ t216 Bet v2	☐ **t241 rPla a 1Maple leaf sycamore, London plane (Plat. Acerifolia)**
☐ t220 Bet v4	☐ **t19 Acacia longifolia**
☐ t23 Cipresso mediterraneo	☐ **t209 Carpino bianco (Carpinus betulus)**
☐ t5 Faggio americano	☐ **t17 Cryptomeria japonica**
☐ t4 Nocciolo	☐ **t15 Frassino (Fraxinus americana)**
☐ t9 Olivo	☐ **t210 Ligustro (Ligustrum vulgare)**
☐ t2 Ontano bianco	☐ **t8 Olmo americano (Ulmus americana)**
☐ t11 Platano	☐ **t16 Pino strobo (Pinus strobus)**
☐ t14 Pioppo	☐ **t7 Quercia bianca (Quercus alba)**
☐ t12 Salice	☐ **t208 Tiglio (Tilia cordata)**
☐ t224 rOle e 1 Olive (Olea europaea)	

DERIVATI EPIDERMICI E PROTEINE ANIMALI

☐ e5 Forfora di cane	☐ **e102 rCan f 2 Dog (Canis familiaris)**
☐ e3 Forfora di cavallo	☐ **e94 rFel d 1 Cat (Felis domesticus)**
☐ e1 Forfora di gatto	☐ **e220 nFel d 2 Cat serum albumin (Felis domesticus)**
☐ e85 Piume di gallina	☐ **e80 Epitelio di capra**
☐ e204 nBos d6 BSA Cow (Bos spp.)	☐ **e6 Epitelio di cavia**
	☐ **e84 Epitelio di hamster (criceto)**
☐ **e89 Piume di tacchino**	☐ **e83 Epitelio di maiale**
☐ **e75 Proteine seriche di ratto**	☐ **e81 Epitelio di pecora**
☐ **e76 Proteine seriche di topo**	☐ **e73 Epitelio di ratto**
☐ **e87 Proteine sieriche e urinarie di ratto**	☐ **e71 Epitelio di topo**
☐ **e74 Proteine urinarie di ratto**	☐ **e4 Forfora di vacca**
☐ **e72 Proteine urinarie di topo**	☐ **e70 Piume d'oca**
☐ **e101 rCan f 1 Dog (Canis familiaris)**	☐ **e86 Piume di anatra**

ALIMENTI

☐ f47 Aglio	☐ f84 Kiwi	☐ **k208 Gal d4 Lisozima uovo**

REGIONE DEL VENETO
ULSS5 POLESANA

Modulo prescrizione IgE Specifiche (Allergeni)

UOC Medicina di Laboratorio

- ☐ f237 Albicocca
- ☐ f1 Albume
- ☐ f202 Anacardio
- ☐ f352 Ara h8
- ☐ f422 Ara h 1
- ☐ f423 Ara h2
- ☐ f424 Ara h3
- ☐ f447 Ara h6
- ☐ f427 Ara h9
- ☐ f13 Arachidi
- ☐ f33 Arancia
- ☐ f80 Astice
- ☐ f7 Avena
- ☐ f96 Avocado
- ☐ f92 Banana
- ☐ f76 Bos d4 alfa lattoalbumina
- ☐ f77 Bos d5 beta lattoglobulina
- ☐ f78 Bos d8 caseina
- ☐ f93 Cacao
- ☐ f27 Carne di bue
- ☐ f213 Carne di coniglio
- ☐ f26 Carne di maiale
- ☐ f83 Carne di pollo
- ☐ f31 Carota
- ☐ f355 Cyp c1 Carpa
- ☐ f299 Castagna
- ☐ f48 Cipolla
- ☐ f428 Cor a1
- ☐ f425 Cor a8
- ☐ f440 Cor a9
- ☐ f439 Cor a14 Hazel nut
- ☐ f15 Fagioli bianchi
- ☐ f44 Fragola
- ☐ f233 Gal d1Ovomucoide
- ☐ f24 Gambero
- ☐ f79 Glutine
- ☐ f23 Granchio comune
- ☐ f4 Grano
- ☐ f8 Granoturco

- ☐ f2 Latte
- ☐ f45 Lievito
- ☐ f20 Mandorla
- ☐ f49 Mela
- ☐ f87 Melone
- ☐ f3 Merluzzo (pesce)
- ☐ f37 Mitili
- ☐ f17 Nocciola
- ☐ f455 rCor a11 Nocciola
- ☐ f457 rCor a16 Nocciola
- ☐ f256 Noce
- ☐ f448 rJug r2 Noce
- ☐ f456 rJug r6 Noce
- ☐ f6 Orzo
- ☐ f35 Patata
- ☐ f94 Pera
- ☐ f95 Pesca
- ☐ f253 Pinoli
- ☐ f12 Piselli
- ☐ f203 Pistacchio
- ☐ f254 Platessa
- ☐ f59 Polpo
- ☐ f86 Prezzemolo
- ☐ f25 Pomodoro
- ☐ f419 Pru p1
- ☐ f420 Pru p3
- ☐ f421 Pru p4
- ☐ f454 Pru p7
- ☐ f9 Riso integrale
- ☐ f85 Sedano
- ☐ f5 Segale
- ☐ f10 Semi di sesamo
- ☐ f14 Semi di soia
- ☐ f58 Seppia
- ☐ f337 Sogliola
- ☐ f40 Tonno
- ☐ f204 Trota
- ☐ f351 Tropomiosina Pen a1
- ☐ f75 Tuorlo
- ☐ f245 Uovo
- ☐ f207 Vongola
- ☐ f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat (Triticum spp.)

- ☐ **f430 rAct d 8 PR-10, Kiwi (Actinidia deliciosa)**
- ☐ **f443 rAna o 3, Cashew nut (Anacardium occidentale)**
- ☐ f352 rAra h 8 PR-10, Peanut (Arachis hypogaea)
- ☐ **f426 rGad c 1 Cod (Gadus morhua)**
- ☐ **f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg (Gallus spp.)**
- ☐ **f353 rGly m 4 PR-10, Soy (Glycine max))**
- ☐ **f431 nGly m 5 beta-conglycinin, Soy (Glycine max)**
- ☐ **f432 nGly m 6 Glycinin (Glycine max)**
- ☐ **f441 rJug r 1 Walnut (Juglans regia)**
- ☐ **f442 rJug r 3 LTP, Walnut (Juglans regia)**
- ☐ **f434 rMal d 1 PR-10, Apple (Malus domestica)**
- ☐ **f435 rMal d 3 LTP, Apple (Malus domestica)**
- ☐ **f433 rTri a 14 LTP, Wheat (Triticum aestivum)**
- ☐ **f313 Acciuga (Engraulis encrasicolus)**
- ☐ **f278 Alloro (Laurus nobilis**
- ☐ **f329 Anguria (Citrullus lanatus)**
- ☐ **f261 Asparago (Asparagus officinalis)**
- ☐ **f304 Aragosta (Palinurus spp.)/Aragosta**
- ☐ **f269 Basilico (Ocimum basilicum)**
- ☐ **f260 Broccoli (Brassica oleracea var. italica)**
- ☐ **f221 Caffè (Coffea spp.)**
- ☐ **f258 Calamaro (Loligo spp.)**
- ☐ **f338 Capesante (Pecten spp.)**
- ☐ **f284 Carne di tacchino (Meleagris gallopavo)**
- ☐ **f296 Carruba**
- ☐ **f216 Cavolo (Brassica oleracea var. capitata)**
- ☐ **f265 Cumino (Carum carvi)**
- ☐ **f287 Fagioli rossi (Phaseolus vulgaris)**
- ☐ **f276 Finocchio fresco (Foeniculum vulgare)**
- ☐ **f81 Formaggio a pasta dura**
- ☐ **f82 Formaggio a pasta molle**
- ☐ **f309 Ceci (Cicer arietinus)**
- ☐ **f244 Cetriolo (Cucumis sativus)**
- ☐ **f268 Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum)**
- ☐ **f242 Ciliegia (Prunus avium)**
- ☐ **f328 Fico (Ficus carica)**
- ☐ **f294 Frutto della passione (Passiflora edulis)**
- ☐ **f212 Funghi, champignon (Agaricus hortensis)**
- ☐ **f297 Gomma arabica**
- ☐ **f246 Gomma di Guar (Cyamopsis tetragonolobus)**
- ☐ **f11 Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)**
- ☐ **f231 Latte bollito**
- ☐ **f300 Latte di capra**
- ☐ **f215 Lattuga (Lactuca sativa)**
- ☐ **f235 Lenticchia (Lens esculenta)**
- ☐ **f208 Limone (Citrus limon)**
- ☐ **f314 Lumaca (Helix aspersa))**
- ☐ **f262 Melanzana (Solanum melongena)**
- ☐ **f332 Menta (Mentha piperita)**
- ☐ **f55 Miglio comune (Panicum milliaceum)**
- ☐ **f288 Mirtillo nero (Vaccinium myrtillis)**
- ☐ **f211 Mora (Rubus fruticosus)**
- ☐ **f18 Noce brasiliana (Bertholletia excelsa)**
- ☐ **f36 Noce di cocco (Cocos nucifera)**

REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA	**Modulo prescrizione IgE Specifiche (Allergeni)** UOC Medicina di Laboratorio	

		☐ **f342 Oliva (Olea europaea)** ☐ **f283 Origano (Origanum vulgare)** ☐ **f293 Papaya (Carica papaya)** ☐ **f218 Paprica, Peperone (Capsicum annuum)** ☐ **f90 Malto** ☐ **f91 Mango (Mangifera indica)** ☐ **f279 Pepe di Cayenna (Capsicum frutescens)** ☐ **f280 Pepe nero (Piper nigrum)** ☐ **f263 Pepe verde (Piper nigrum)** ☐ **f209 Pompelmo (Citrus paradisi)** ☐ **f255 Prugna (Prunus domestica)** ☐ **f61 Sardina (Sardinops melanosticta)** ☐ **f224 Semi di papavero (Papaver somniferum)** ☐ **f89 Senape (Brassica/Sinapis spp.)** ☐ **f214 Spinaci (Spinachia oleracea)** ☐ **f259 Uva (Vitis vinifera)** ☐ **f340 Rosso cocciniglia (Dactylopius coccus)** ☐ **f41 Salmone (Salmo salar)** ☐ **f270 Zenzero (Zingiber officinale)** ☐ **f225 Zucca (Cucurbita pepo)** ☐ **f206 Sgombro (Scomber scombrus)** ☐ **f98 Gliadina**

ERBE

☐ w1 Ambrosia (Ambrosia elatior) ☐ w5 Assenzio maggiore ☐ w6 Assenzio selvatico ☐ w10 Farinaccio ☐ w9 Lanciuola ☐ w7 Margherita dei prati ☐ w19 Parietaria off. ☐ w21 Parietaria jud. ☐ w211 Par j2 ☐ w231 nArt v 1 Mugwort (Artemisia vulgaris)	☐ **w230 nAmb a 1 Ragweed (Ambrosia elatior)** ☐ **w233 nArt v 3 LTP, Mugwort (Artemisia vulgaris)** ☐ **w234 rPla l 1 Plantain (Plantago lanceolata)** ☐ **w18 Acetosa minore (Rumex acetosella)** ☐ **w3 Ambrosia trifida** ☐ **w15 Atriplex lentiformis** ☐ **w16 Ciliatalva** ☐ **w204 Girasole (Helianthus annuus)** ☐ **w17 Granata (Kochia scoparia))** ☐ **w20 Ortica comune (Urtica dioica)** ☐ **w8 Taraxacum vulgare** ☐ **w12 Verga d'oro (Solidago virgaurea)**

FARMACI E MISCELLANEA

☐ c6 Amoxicillina ☐ c1 Peniclloyl G ☐ c2 Penicilloyl V ☐ c5 Ampicillina ☐ Ro214 MUXF3 CCD bromelina	☐ c202 Succinilcolina (Suxamethonium (succinylcholine) ☐ **c7 Cefaclor**

MUFFE E POLVERI DI CASA

☐ m6 Alternaria alternata ☐ m3 Aspergillus fumigatus ☐ m5 Candida albicans ☐ m2 Cladosporium herbarum ☐ m4 Mucor racemosus	☐ **m12 Aureobasidium pullulans** ☐ **m7 Botrytis cinerea** ☐ **m16 Curvularia lunata** ☐ **m80 Enterotossina A di Staffilococco** ☐ **m81 Enterotossina B di Staffilococco**

REGIONE DEL VENETO
ULSS5 POLESANA

Modulo prescrizione IgE Specifiche (Allergeni)

UOC Medicina di Laboratorio

☐ m1 Penicillum notatum	☐ **m223 Enterotossina C di Staffilococco**
☐ h1 Polvere da Greer Labs.Inc	☐ **m226 Enterotossina TSST di Staffilococco**
☐ h2 Polvere da Hollister-Stiers Labs	☐ **m9 Fusarium proliferatum (F. moniliforme)**
	☐ **m227 Malassezia spp.**
☐ **m229 rAlt a 1 (Alternaria alternata)**	☐ **m13 Phoma betae**
☐ **m218 rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus)**	☐ **m11 Rhizopus nigricans**
☐ **m219 rAsp f 2 (Aspergillus fumigatus)**	☐ **m8 Setomelanomma rostrata (Helminthosporium halodes)**
☐ **m220 rAsp f 3 (Aspergillus fumigatus)**	☐ **m10 Stemphylium herbarum (S. botryosum)**
☐ **m221 rAsp f 4 (Aspergillus fumigatus)**	☐ **m201 Tilletia tritici**
☐ **m222 rAsp f 6 (Aspergillus fumigatus)**	☐ **m211 Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale**
☐ **m207 Aspergillus niger**	

POLLINI DI GRAMINACEE

☐ g13 Bambagiona	☐ g210 Phl p7
☐ g6 Coda di topo	☐ g212 Phl p12
☐ g2 Erba canina	☐ g215 rPhl p5b Timothy (Phleum pratense)
☐ g3 Erba mazzolina	
☐ g15 Grano	☐ **g216 nCyn d 1 Bermuda grass (Cynodon dactylon)**
☐ g202 Granoturco	☐ **g209 rPhl p 6 Timothy (Phleum pratense)**
☐ g8 Gramigna dei prati	☐ **g211 rPhl p 11 Timothy (Phleum pratense)**
☐ g5 Logliarello	☐ **g10 Cannarecchia (Sorghum halepense)**
☐ g1 Paleino odoroso	
☐ g4 Paleo dei prati	
☐ g205 rPhl p1 Timothy (Phleum pratense)	
☐ g206 rPhl p2 Timothy (Phleum pratense)	
☐ g208 nPhl p4 Timothy (Phleum pratense)	

PROFESSIONALI

☐ k82 Lattice	☐ **k87 nAsp o 21 alpha-amylase (Aspergillus oryzae)**
	☐ **k79 Anidride ftalica**
☐ **k215 rHev b 1 Latex (Hevea brasiliensis)**	☐ **k81 Ficus benjamina (Ficus spp.)**
☐ **k217 rHev b 3 Latex (Hevea brasiliensis)**	☐ **k80 Formalina Formaldeide**
☐ **k218 rHev b 5 Latex (Hevea brasiliensis)**	☐ **k76 Isocianato MDI (Diphenylmethane diisocyanate)**
☐ **k220 rHev b 6.02 Latex (Hevea brasiliensis)**	☐ **k75 Isocianato TDI (Toluene diisocyanate)**
☐ **k221 rHev b 8 Profilin, Latex (Hevea brasiliensis)**	☐ **k78 Ossido di etilene**
☐ **k224 rHev b 11 Latex (Hevea brasiliensis)**	

VELENO D'INSETTI

☐ i1 Ape	☐ **i8 Baco da seta (Bombyx mori)**
☐ i2 Calabrone bianco	☐ **i5 Calabrone giallo (Dolichovespula arenaria)**
☐ i75 Calabrone europeo	☐ **i70 Formica (Solenopsis invicta)**
☐ i3 Giallone	☐ **i73 Larve rosse di zanzara (Chironomus thummi)**
☐ i4 Vespa	☐ **i6 Scarafaggio (Blatella germanica)**
☐ i77 Vespa europea	☐ **i71 Zanzara comune (Aedes communis)**
☐ i214 Api m2 (Apis mellifera)	
☐ i215 Api m3 (Apis mellifera)	
☐ i216 Api m5 (Apis mellifera)	
☐ i204 Tafano (Tabanus spp.)	
☐ i205 Bombo (Bombus terrestris)	
☐ i208 rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee (Apis mellifera)	
☐ i209 rVes v 5 Common wasp (Vespula vulgaris)	

REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA	**Modulo prescrizione IgE Specifiche (Allergeni)** UOC Medicina di Laboratorio	

□ i210 rPol d 5 Paper wasp (Polistes dominulus) □ i211 rVes v 1 Phospholipase A1, Common wasp (Vespula vulg.) □ i217 rApi m10, Honey bee (Apis mellifera)	

PARASSITI
□ P1Ascaris □ P4 Anisakis

*Gli allergeni in **grassetto** sono eseguiti presso AOU Padova*

REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA	**Modulo Consenso informato Analisi Genetiche** UOC MEDICINA di LABORATORIO	

Le analisi genetiche comprendono esami eseguiti su DNA allo scopo di individuare alterazioni del patrimonio genetico che possono predisporre o causare sviluppo di malattie. Tutti i risultati ottenuti dalle analisi genetiche, così come ogni altro atto medico, sono da considerare strettamente confidenziali e sottoposti al vincolo del segreto professionale e nel rispetto della privacy (D.lgs196/2003).

Il/La sottoscritto/a……..……,nato/a a……..……

il …….

☐ ACCONSENTE

☐ NON ACCONSENTE

ad essere sottoposto al prelievo ematico e di essere stato informato dal Medico prescrittore per l'analisi del/i seguente/i test genetico/i:

- ☐ Mutazione del fattore V Leiden (mutazione G1691A) *cod.reg. G1.91_3* e mutazione del Fattore II Protrombina (mutazione G20210A) *cod.reg. G1.91_4*
- ☐ BCR/ABL qualitativo per diagnosi *cod.reg. G8.01_16*
- ☐ BCR/ABL quantitativo per monitoraggio terapia *cod.reg. G8.01_17*
- ☐ Tipizzazione Locus HLA DQA1 (alleli 0201, 03,05) Locus HLA-DQB1 (alleli 02, 0302) *cod.reg. 90.80.2_0 90.80.4_0*
- ☐ JAK 2 mutazione *cod.reg. G1.91_15*
- ☐ HFE (genetica Emocromatosi**)** *Cod.reg. G1.0210_2*

Firma del paziente

……

(Solo in caso di paziente minorenne)

Cognome e Nome genitore /tutore legale

……

Firma genitore /tutore legale

……

Etichetta anagrafica paziente
(a cura del Centro Prelievi)

OBBLIGATORIA

Modulo da consegnare al momento dell'accettazione presso il Centro Prelievi

REGIONE DEL VENETO ULSS5 POLESANA	**Dichiarazione sostitutiva consegna campioni biologici da parte terza** UOC MEDICINA di LABORATORIO	

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n. _____

Estremi del documento identificativo	O Carta d'identità O Patente O Altro ..... n° _____ rilasciato da _____ il _____ **Allegare copia documento**

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a il _____

a _____, residente a _____

in Via _____ n. _____

alla consegna di campioni biologici che consistono in:

- **CAMPIONE URINE**
- **CAMPIONE FECI**
- **CAMPIONE EMATICO**
- **TAMPONE**
- **ALTRO** _____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE :

a) la responsabilità di tutte le fasi operative precedenti e contestuali alla consegna al Laboratorio (prelievo, raccolta, conservazione, trasporto e consegna) è esclusivamente in capo al firmatario che effettua la consegna.
b) il paziente è a conoscenza della destinazione dei campioni e acconsente all'effettuazione delle analisi nonché al necessario trattamento dati.
c) il firmatario che effettua la consegna è interamente responsabile della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Data _____ Firma Paziente _____

Firma Delegato _____